

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Winterroggen 2018, Anbaugebiet D-Süd, Standorte Brandenburg, vorläufig
 Stand: 07.08.2018
 Kornertrag dt/ha (rel)

Intensität	Sorte	Kleptow	Kliestow	Lüchfeld	Petkus	Ruhlsdorf	Sonne- walde
ohne Fungizid / WR	1 SU Performer(B)	95			97		106
	2 SU Cossani(B)	104			101		100
	3 SU Bendix(B)	110			104		91
	4 KWS Daniello(B)	104			106		99
	5 KWS Gatano(B)	97			100		104
	6 KWS Binntto	98			104		108
	7 KWS Eterno	105			102		108
	8 KWS Edmondo	105			104		102
	9 KWS Serafino	106			109		98
	10 SU Arvid	111			115		98
	11 Inspector(B)	90			92		101
	Mittel	102			103		101
	Mittel (B)	72,5			65,4		61,1
Grenzdif.	11			11		9	
mit Fungizid / WR	1 SU Performer(B)	99	106	95	104	106	107
	2 SU Cossani(B)	102	98	101	99	101	102
	3 SU Bendix(B)	113	104	96	106	105	102
	4 KWS Daniello(B)	94	105	115	103	101	97
	5 KWS Gatano(B)	98	103	107	98	98	98
	6 KWS Binntto	104	104	119	91	99	106
	7 KWS Eterno	104	103	108	98	97	103
	8 KWS Edmondo	105	106	123	100	106	106
	9 KWS Serafino	105	106	117	104	104	107
	10 SU Arvid	114	104	108	116	111	100
	11 Inspector(B)	93	84	87	90	89	94
	Mittel	103	102	107	101	102	102
	Mittel (B)	74,9	65,5	58,5	73,8	48,2	59,5
Grenzdif.	11	10	13	10	9	10	

Hybridsorten; Inspector = Populationssorte
 Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Winterroggen 2018, Anbaugebiet D-Süd, Standorte Brandenburg, vorläufig
 Stand: 07.08.2018
 Kornertrag dt/ha (abs)

Intensität	Sorte	Kleptow	Kliestow	Lüchfeld	Petkus	Ruhlsdorf	Sonne- walde
ohne Fungizid / WR	1 SU Performer(B)	68,7			63,3		64,7
	2 SU Cossani(B)	75,5			66,2		61,4
	3 SU Bendix(B)	79,7			67,9		55,4
	4 KWS Daniello(B)	75,6			69,5		60,4
	5 KWS Gatano(B)	70,5			65,2		63,3
	6 KWS Binntto	70,9			67,8		66,1
	7 KWS Eterno	76,5			66,9		66,0
	8 KWS Edmondo	76,3			67,8		62,1
	9 KWS Serafino	76,8			71,5		60,1
	10 SU Arvid	80,4			74,9		59,6
	11 Inspector(B)	65,4			60,4		61,5
	Mittel	74,2			67,4		61,9
	Mittel (B)	72,5			65,4		61,1
Grenzdif.	8,3			7,5		5,8	
mit Fungizid / WR	1 SU Performer(B)	74,2	69,4	55,5	76,4	51,2	63,5
	2 SU Cossani(B)	76,4	64,1	59,1	73,1	48,7	60,5
	3 SU Bendix(B)	84,8	68,4	56,0	78,3	50,5	60,8
	4 KWS Daniello(B)	70,7	68,8	67,2	75,7	48,7	57,7
	5 KWS Gatano(B)	73,7	67,6	62,4	72,7	47,0	58,4
	6 KWS Binntto	77,6	68,4	69,5	67,2	47,5	62,9
	7 KWS Eterno	77,6	67,2	63,1	72,6	46,8	61,1
	8 KWS Edmondo	79,0	69,2	71,9	73,5	51,0	63,0
	9 KWS Serafino	78,9	69,4	68,6	76,7	50,2	63,7
	10 SU Arvid	85,6	68,1	62,9	85,3	53,5	59,3
	11 Inspector(B)	69,4	54,8	50,7	66,8	43,1	56,2
	Mittel	77,1	66,9	62,5	74,4	48,9	60,6
	Mittel (B)	74,9	65,5	58,5	73,8	48,2	59,5
Grenzdif.	8,3	6,3	7,7	7,5	4,4	5,8	

Hybridsorten; Inspector = Populationssorte
 Mittel (B) = Bezugsbasis